

U 46[®] MCPA

MCPA-500

Toelatingsnummer: 7737 N

Werkzame stof: MCPA

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Gehalte: 500 g/l

Lotnummer: zie verpakking

Gevarenaanduidingen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P264 Na het werken met dit product kleding grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.



GEVAAR



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

® = Geregistreerd
handelsmerk Nufarm.

UFI: PSFP-C63P-DGAC-K35F

7737-10-L2-1022

10 L

510004175_102022

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl



0 87 20364 28110 6

Nufarm
Grow a better tomorrow

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Granen m.u.v teff, spelt en kanariezaad	Na opkomst	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per teeltcyclus
Appel	Bodemtoepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Peer	Bodemtoepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Boomkwekerijgewassen	Bodemtoepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Houtige beplanting	Bodemtoepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Onbeteeld terrein		breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per 12 maanden

¹ Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting (alleen op de zwartstrook), waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

³ Dit is de totale dosering die per "behandeld oppervlak" (zwartstrook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

Het gebruik in spelt, vezelvlas, Japanse haver, kweeper, mispel, gladiol en siergrassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van riet is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Spelt	Na opkomst	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per teeltcyclus
Vezelvlas	Na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 x per teeltcyclus

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Japanse haver	Na opkomst	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per teeltcyclus
Kweeper	Bodem-toepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Mispel	Bodem-toepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² boomgaard	1 x per 12 maanden
Gladiol (vermeerderings- teelt)	Bodem-toepassing ¹	breedbladige onkruiden	3,6 l/ha ³ zwartstrook	1,8 l/ha ² totale perceel	1 x per teeltcyclus
	Over het gewas		1,5 l/ha	1,5 l/ha	
Siergrassen (onbedekt, niet- grondgebonden teelt)	Over het gewas, rugspuit, pleks- gewijs	breedbladige onkruiden	0,1875% (187,5 ml per 100 L water), max 0,15ml middel/m ²	0,15 l/ha ⁴	1 x per 12 maanden
	Over het gewas met spuitboom		1,5 L/ha	1,5 L/ha	
Siergrassen (onbedekt, grondgebonden)	Over het gewas	breedbladige onkruiden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	1 x per 12 maanden
Riet	Pleksgewijs	Haagwinde ⁵	0,2% (200 ml/100l water), max 0,2 ml middel/m ²	0,2 l/ha ⁴	1 x per 12 maanden

¹ Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting (alleen op de zwartstrook), waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

³ Dit is de totale dosering die per "behandeld oppervlak" (zwartstrook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

⁴ Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

⁵ Haagwinde (*Calystegia sepium*)

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om zoogdieren te beschermen is de bodemtoepassing in de vermeerderingsteelt van gladiol uitsluitend toegestaan voor de knolvorming (<BBCH40).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in riet uitsluitend toegestaan in riet dat op het vaste land staat, middels gebruik van een rugspuit, waarbij het middel alleen pleksgewijs mag worden toegediend en een bufferzone van minimaal 2 meter t.o.v. het wateroppervlak dient te worden aangehouden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten binnen het te behandelen riet te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan door gecertificeerde natuurbeheerders of personen werkend onder een groeps-certificaat natuurbe-

heer, waarbij blootstelling aan het middel zoveel als mogelijk beperkt wordt tot de te bestrijden planten en slechts bij een zeer lage windsnelheid (zwakke wind) gespoten mag worden. Om niet tot de doelsoorten behorende planten buiten het te behandelen riet te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een rugsput met een afschermkap en/of minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Bijproducten van behandelde vezelmas niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen. Met dit product behandeld Japanse haver mag niet voor vervoederingsdoeleinden en/of in de handel worden gebracht.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof MCPA. MCPA behoort tot de phenoxy-carboxyl-zuren.

De Hrac code is O. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van Resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Werkingswijze en algemene gebruiksaanwijzing

U 46® MCPA is een groeistofachtig bladherbicide met systemische werking.

Het werkt tegen eenjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden.

Grassen worden niet gedood.

De onkruiden kunnen zowel in een jong stadium als in een oud stadium worden bestreden.

De onkruiden dienen voldoende blad te hebben gevormd.

U 46® MCPA werkt het beste bij groeizaam weer, het dient niet te worden toegepast bij felle zonneschijn.

Tijdens de toepassing van het middel en enkele uren daarna dient het droog te zijn.

Bij de toepassing van het middel dienen het gewas en de onkruiden droog te zijn.

U 46® MCPA kan schade doen aan veel gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Zeer gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld bieten, in een jong stadium en witlof, in een jong en in een laat stadium, met name in de zomer en herfst.

U 46® MCPA dient met een grove druppel en bij lage druk te worden verspoten.

Toepassingen

Granen m.u.v. teff, spelt en kanariezaad

Toepassen tegen diverse breedbladige onkruiden in na-opkomst.

- In winter- en zomerganen, tarwe, gerst, rogge en triticale, toepassen vanaf begin uitstoeiing tot en met vlagblad volledig uitgegroeid (BBCH20-39).

- In haver toepassen vanaf begin uitstoeiing tot einde uit-

stoeiing, begin strekking (BBCH20-30).

Dosering: 3,6 l/ha. Maximum 1 toepassing per teeltcyclus

Onder appel en peer

Toepassen tegen breedbladige onkruiden op de zwartstrook bij goed bewortelde appel- en perenbomen die minstens 2 jaar ter plaatse staan.

Van zodra de eerste blaadjes van de appels en peren uitgerold zijn tot dat 50% van de bladeren verkleurd zijn (BBCH11-95). Bij voorkeur niet toepassen rondom de bloei.

Ter voorkoming van beschadiging verdient het aanbeveling het middel met een grove druppel en/of met een afschermkap te spuiten.

Dosering: 3,6 l/ha zwartstrook of 1,8 l/ha boomgaard.

Maximum 1 toepassing per 12 maanden.

Onder boomkwekerijgewassen

Toepassen tegen breedbladige onkruiden op de zwartstrook.

Van zodra de eerste blaadjes van de boomkwekerijgewassen uitgerold zijn tot dat 50% van de bladeren verkleurd zijn (BBCH 11-95).

Dosering: 3,6 l/ha zwartstrook of 1,8 l/ha totale perceel.

Maximum 1 toepassing per 12 maanden.

Onder houtige beplanting

Toepassen tegen breedbladige onkruiden op de zwartstrook.

Van zodra de eerste blaadjes van de houtige beplantingen uitgerold zijn tot dat 50% van de bladeren verkleurd zijn. (BBCH11-95).

Dosering: 3,6 l/ha zwartstrook of 1,8 l/ha totale perceel.

Maximum 1 toepassing per 12 maanden.

Onbeteeld terrein

Toepassen zodra het breedbladig onkruid voldoende blad

heeft ontwikkeld voor een goede opname van het middel. Bij stoppelbehandeling moet de stoppel ongeveer 3 weken blijven liggen, geen kruisbloemige gewassen inzaaien. Dosering: 3,6 l/ha. Maximum 1 toepassing per 12 maanden.

Spelt en Japanse haver.

Toepassen in na-opkomst tegen diverse breedbladige onkruiden.

Dosering: 3,6 l/ha. 1 x per teeltcyclus

Vezelvlas

Toepassen in na-opkomst tegen diverse breedbladige onkruiden.

Dosering: 0,75 l/ha. 1 x per teeltcyclus.

Kweepeer en Mispel

Toepassen tegen breedbladige onkruiden op de zwartstrook bij goed gewortelde bomen.

Dosering: 3,6 l/ha zwartstrook of 1,8 l/ha boomgaard. 1x per 12 maanden.

Gladiol (vermeerderingsteelt)

- Toepassen tegen breedbladige onkruiden zonder de planten te raken.

Dosering: 3,6 l/ha zwartstrook of 1,8 l/ha volvelds. 1x per teeltcyclus.

- Toepassen over het gewas.

Dosering: 1,5 l/ha. 1 x per teeltcyclus.

Siergrassen (onbedekt, niet-grondgebonden teelt)

- Toepassen over het gewas, met rugspuit of pleksgewijs.

Dosering: 0,1875% (187,5 ml per 100 l water) of maximaal 0,15 l/ha. 1 x per 12 maanden.

- Toepassen over het gewas met spuitboom

Dosering: 1,5 l/ha. 1 x per 12 maanden.

Siergrassen (onbedekt, grondgebonden)

Toepassen over het gewas tegen breedbladige onkruiden.

Dosering: 1,5 l/ha. 1 x per 12 maanden.

Riet ter bestrijding van haagwinde (*Calystegia sepium*)

Uitsluitend toegestaan in riet dat op het vaste land staat, middels gebruik van een rugspuit, pleksgewijs.

Dosering middel per toepassing: 0,2% (200 ml/100l water), max 0,2 ml middel/m². 1 x per 12 maanden.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten.

Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

U 46[®] MCPA

MCPA-500

Toelatingsnummer: 7737 N

Werkzame stof: MCPA

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Gehalte: 500 g/l

Lotnummer: zie verpakking

Gevarenaanduidingen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P264 Na het werken met dit product kleding grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.



GEVAAR



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

® = Geregistreerd
handelsmerk Nufarm.

UFI: PSFP-C63P-DGAC-K35F

7737-10-L2-1022

10 L

510004175_102022

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl



0 87 20364 28110 6

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow

U 46[®] MCPA

MCPA-500

Herbicide voor de bestrijding van eenjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.

Toelatingsnummer: 7737 N

Werkzame stof: MCPA

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Voor professioneel gebruik.

Lees altijd voor gebruik het gehele etiket.

Geregistreerd handelswerk Nufarm

5 L

510004179_012021

Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7

2909 LC Capelle aan den IJssel

Tel.: 010-3037725

www.nufarm.com/nl



0 87 20364 28112 0

