

Insekticid

Carnadine®

Ny insekticid i unik formulering med systemisk verkan och långtidseffekt!



CARNADINE®

- tillför ett nytt och viktigt verktyg för insektsbehandling
- ger långtidsverkan och köper dyrbar tid under säsongen
- har effekt på en mängd olika skadeinsekter och deras olika levnadsstadier
- kombinerar en snabb synlig effekt med långtidseffekt genom systemisk och translaminär transport i grödan
- är inte klassat som bifarligt



Nytt verktyg mot skadeinsekter på den svenska marknaden!

- Carnadine innehåller acetamiprid i flytande formulering, 200 g/L
- Translaminär och systemisk transport i grödan, skyddar hela plantan
- Både kontakt- och magverkan hos skadeinsekter- såväl snabb som långtidseffekt!
- Klassas ej som bifarlig, mer skonsam mot pollinatörer än t.ex. pyretroider



CARNADINE skyddar värdet hos viktiga grödor

- Sockerbeter (även foderbeter samt rödbeter) i BBCH 20-49
- Morötter i BBCH 20-39
- Ärtor, bönor, äkerbönor i BBCH 40-71
- Potatis i BBCH 40-79
- Stråsäd i BBCH 30-69



Systemisk verkan underlättar kontroll av insekter som sitter gömda, t.ex. trips och bladlöss



Nytt verknings sätt i flera grödor - viktigt ur resistenssynpunkt!



Effektivt mot många skadeinsekter - mindre farligt för pollinatörer än t.ex. pyretroider



Gullviks




Säljs endast av Gullviks



Följ oss på Instagram
nufarm_sweden

nufarm.com/se www.gullviks.se



Nufarm

Grow a better tomorrow

Carnadine

Det nya verktyget mot skadeinsekter



Produktfakta	Carnadine®
Aktiv substans	Acetamiprid, 200 g/L
Kemisk grupp	Neonikotinoid, IRAC grupp 4A
Formulering	SL- Vattenlösligt koncentrat
Verkningssätt	Systemisk och translaminär. Kontakt- och magverkan på skadeinsekter.
Godkända grödor	Mot insektsangrepp i potatis, stråsäd, sockerbetor, foderbetor, rödbetor, ärter, bönor, äkerbönor, morot, och nyetablerad kummin.
Förpackningsstorlek	1 L, 5 L



Användningsområden Carnadine	Skadegörare	Max dos vid behandling l/ha
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Mot bl.a. betfluga och betbladlus	0.25
Morötter	Mot bl.a. morotsfluga	0.25
Ärter, bönor, äkerbönor	Mot bl.a. ärtvecklare och bönsmyg	0.25
Stråsäd	Mot bl.a. trips	0.2
Potatis, BBCH 40-79 (Karens till skörd: 7 dgr)	Mot bl.a. kolorado-skallbagge	0.18

Läs etiketten för detaljerad användning.



CARNADINE är registrerat varumärke för Nufarm
Läs alltid etiketten för användning
Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd



Säljs endast av Gullviks www.gullviks.se

KORTA FRÅGOR OCH SVAR VID ANVÄNDNING AV CARNADINE

Om det kommer regn direkt efter behandlingen, måste jag köra igen?

CARNADINE har en regnfasthet på 2 timmar, det betyder att regn 2 timmar efter behandlingen under normala förhållanden inte påverkar resultatet.

Hur mycket vatten bör jag använda vid behandling?


CARNADINE tas upp i behandlade växtdelar och transporteras sedan med saftströmmen ut i plantan mot tillväxtpunkterna.

För god effekt i täta bestånd och behov av att kontrollera lågt sittande insekter är en högre vätskemängd att föredra för bästa nedträngning och upptag.

Rekommenderad vattenmängd är 200-600 L/ha. Den lägsta vattenmängden kan användas i öppna/lågväxande grödor.

Blandbarhet

CARNADINE är blandbart med aktuella ogräs-, svamp- och mikronäringsmedel



 **Nufarm**
Grow a better tomorrow